

Deficiencia de factor VII

EN SU MUNDO, LA EXPERIENCIA ES IMPORTANTE



TAYLOR tiene deficiencia de factor VII.



# ¿Recibe tratamiento por su deficiencia de factor VII?

La deficiencia de factor VII es un trastorno hemorrágico muy poco frecuente en el cual hay niveles bajos de factor VII en la sangre. Cuando no hay suficiente factor VII en la sangre, la coagulación puede demorar mucho más de lo normal o es posible que no se produzca en absoluto. Hombres y mujeres se ven afectados por igual.

La deficiencia de factor VII puede deberse a la presencia de un gen anormal heredado de ambos padres. La deficiencia de factor VII puede detectarse al nacer; sin embargo, algunas personas con deficiencia leve pueden llegar a la adultez sin saber que la tienen. La deficiencia de factor VII también puede aparecer en personas que no la presentaron al nacer, debido a diversas causas.

## Signos y síntomas de la deficiencia de factor VII

- Sangrados frecuentes de la nariz
- Formación frecuente de moretones
- Sangrado en las encías
- Sangrado menstrual intenso y prolongado en las mujeres
- Sangrado en los músculos y las articulaciones
- Sangrado intestinal
- Sangrado en la cabeza en recién nacidos
- Sangrado prolongado después de una cirugía

## La deficiencia de factor VII afecta

a 1 de cada 500,000 personas

## Tratamientos disponibles

- Plasma fresco congelado
- Concentrado de factor VII activado recombinante

Si no se recibe tratamiento, las hemorragias en articulaciones pueden ocasionar daño permanente en las articulaciones con el tiempo.

El 70% de los pacientes con hemorragias en las articulaciones tenían menos de 5 años de edad; por lo cual, el tratamiento temprano con la terapia correcta es crucial.



# NovoSeven® RT:

## Experiencia en lo que es importante

### Control de las hemorragias, cuando sea que sucedan

- Ha demostrado ser eficaz para tratar la deficiencia de factor VII en el hogar

### Seguridad respaldada por la experiencia clínica

- Se ha informado una baja incidencia de coágulos sanguíneos en los ensayos clínicos

### Velocidad cuando se necesita

- Se puede mezclar e infundir con rapidez, y controla las hemorragias rápidamente\*

### NovoSeven® RT: el compromiso de mejorar su experiencia

- Más de 30 años de investigación y experiencia clínica a largo plazo\*

### ¿Qué es NovoSeven® RT?

NovoSeven® RT (factor de coagulación VIIa, recombinante) es un medicamento inyectable que se usa para lo siguiente:

- El tratamiento de hemorragias y la prevención de hemorragias en cirugías e intervenciones de adultos y niños con hemofilia A o B con inhibidores, deficiencia congénita de factor VII (FVII) o trombostenia de Glanzmann con respuesta reducida o nula a las transfusiones de plaquetas
- El tratamiento de hemorragias y la prevención de hemorragias en cirugías e intervenciones de adultos con hemofilia adquirida

### Información importante de seguridad

#### ¿Qué es lo más importante que debo saber sobre NovoSeven® RT?

NovoSeven® RT puede causar efectos secundarios graves, entre ellos, los siguientes:

- Se han informado casos de formación de coágulos de sangre graves en las venas y las arterias con el uso de NovoSeven® RT.
- Su profesional de la salud debe hablarle sobre los riesgos y explicarle los signos y síntomas de los coágulos de sangre. Algunos signos de un coágulo de sangre pueden ser dolor, hinchazón, sensación de calor, enrojecimiento o un bulto en las piernas o los brazos, dolor de pecho, falta de aliento, o un dolor de cabeza intenso y repentino, y/o pérdida de la conciencia o función.
- Durante el tratamiento con NovoSeven® RT, su profesional de la salud debe supervisarlos para detectar la presencia de coágulos de sangre.

\*Se administra como una inyección lenta en bolo durante 2 a 5 minutos, según la dosis.

\*El uso compasivo, también llamado acceso ampliado, comenzó en 1988; la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) se obtuvo en 1999.



TAYLOR tiene deficiencia de factor VII.



Lea toda la Información importante de seguridad adicional.  
Consulte la Ficha técnica adjunta.


**NovoSeven® RT**  
Coagulation Factor VIIa  
(Recombinant)




# Logre un **control demostrado de las hemorragias** con NovoSeven® RT

Detiene de manera eficaz las hemorragias

Episodios hemorrágicos quirúrgicos y no quirúrgicos



Pacientes en estudios



El factor VII recombinante activado (rFVIIa) está recomendado por el MASAC en pacientes con deficiencia de factor VII

MASAC=Medical and Scientific Advisory Council (Consejo Asesor Médico y Científico)  
<sup>a</sup>A partir de un análisis de casos publicados y personas que participaron en ensayos y registros.

**NovoSeven® RT**  
Coagulation Factor VIIa  
(Recombinant)



**BARBARA** tiene deficiencia de factor VII.

## Información importante de seguridad

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre NovoSeven® RT? (continuación)

NovoSeven® RT puede causar efectos secundarios graves, entre ellos, los siguientes: (continuación)

- No debe utilizar NovoSeven® RT si ha tenido reacciones alérgicas (hipersensibilidad), incluso reacciones graves en todo el cuerpo (anafilaxia), a NovoSeven® RT o a cualquiera de sus ingredientes, o a los ratones, los hámsteres o las vacas. Los signos de una reacción alérgica son, entre otros, falta de aliento, sarpullido, comezón (prurito), enrojecimiento de la piel (eritema), desmayos o mareos.



Lea toda la Información importante de seguridad adicional.  
Consulte la Ficha técnica adjunta.

# NovoSeven® RT: un perfil de **seguridad demostrado** que proviene de la experiencia<sup>a</sup>

<sup>a</sup>El uso compasivo, también llamado acceso ampliado, comenzó en 1988; la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) se obtuvo en 1999.

## La seguridad de NovoSeven® RT se ha estudiado a fondo

- Actúa en el lugar de la lesión
- En los ensayos clínicos, se ha informado **una baja incidencia de coágulos sanguíneos**

## La producción recombinante reduce al mínimo la posibilidad de contaminación vírica

- Se fabrica sin sangre ni plasma humanos

## Información importante de seguridad

### ¿Qué debo decirle a mi profesional de la salud antes de usar NovoSeven® RT?

- Dígame a su profesional de la salud si tiene alguna de estas afecciones, ya que podrían aumentar su riesgo de tener coágulos de sangre:
  - hemofilia congénita y además recibe tratamiento con concentrados del complejo de protrombina activado (activated prothrombin complex concentrates, aPCCs)
  - es un paciente de edad avanzada, particularmente si tiene hemofilia adquirida y recibe otros medicamentos para detener las hemorragias
  - antecedentes de enfermedades cardíacas o vasculares
- Dígame a su profesional de la salud y a su farmacéutico todos los medicamentos que esté tomando, incluidos todos los medicamentos de venta libre y con receta, suplementos y hierbas medicinales.




**TAYLOR** tiene deficiencia de factor VII.



Lea toda la Información importante de seguridad adicional.  
Consulte la Ficha técnica adjunta.

**NovoSeven® RT**  
Coagulation Factor VIIa  
(Recombinant)




# Vea lo que es mezclar e infundir rápidamente con NovoSeven® RT

## NovoSeven® RT con MixPro® es rápido de mezclar

- Gracias a la jeringa precargada se evitan los pasos adicionales de llenar la jeringa con diluyente

## Rápido de infundir

- NovoSeven® RT se administra en una inyección en bolo intravenosa (i.v.).
- NovoSeven® RT tiene un volumen de infusión bajo\*
- La infusión de NovoSeven® RT solo lleva entre 2 y 5 minutos



Visite [NovoSevenRT.com](http://NovoSevenRT.com) para encontrar un representante de Novo Nordisk en su zona y solicitar un kit inicial para pacientes.

\*Se administra como una inyección lenta en bolo durante 2 a 5 minutos, según la dosis.



**BARBARA** tiene deficiencia de factor VII.

## Información importante de seguridad

### ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de NovoSeven® RT?

- Los efectos secundarios más comunes y graves son los coágulos de sangre.
- Dígame a su profesional de la salud si tiene algún efecto secundario que le molesta o que no desaparece, y busque atención médica de inmediato si tiene signos de un coágulo de sangre o una reacción alérgica.



Lea toda la Información importante de seguridad adicional. Consulte la Ficha técnica adjunta.

**NovoSeven® RT**  
Coagulation Factor VIIa  
(Recombinant)



NovoSeven® RT:

## Experiencia en lo que es importante



### Control de las hemorragias, cuando sea que sucedan

- Ha demostrado ser eficaz para tratar la deficiencia de factor VII en el hogar

### Seguridad respaldada por la experiencia clínica

- En los ensayos clínicos, se ha informado una baja incidencia de coágulos sanguíneos

### Velocidad cuando se necesita

- Se puede mezclar e infundir con rapidez y controla las hemorragias rápidamente\*

### NovoSeven® RT: el compromiso de mejorar su experiencia

- Más de 30 años de investigación y experiencia clínica a largo plazo<sup>o</sup>



Más información en [NovoSevenRT.com](http://NovoSevenRT.com)

\*Se administra como una inyección lenta en bolo durante 2 a 5 minutos, según la dosis.

<sup>o</sup>El uso compasivo, también llamado acceso ampliado, comenzó en 1988; la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) se obtuvo en 1999.

**XAVIER** tiene deficiencia de factor VII.

## Información importante de seguridad

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre NovoSeven® RT?

**NovoSeven® RT puede causar efectos secundarios graves, entre ellos, los siguientes:**

- Se han informado casos de formación de **coágulos de sangre graves** en las venas y las arterias con el uso de NovoSeven® RT.
- Su profesional de la salud debe hablarle sobre los riesgos y explicarle los signos y síntomas de los coágulos de sangre. Algunos signos de un coágulo de sangre pueden ser dolor, hinchazón, sensación de calor, enrojecimiento o un bulto en las piernas o los brazos, dolor de pecho, falta de aliento, o un dolor de cabeza intenso y repentino y/o pérdida de la conciencia o función.
- Durante el tratamiento con NovoSeven® RT, su profesional de la salud debe supervisarlos para detectar la presencia de coágulos de sangre.

Lea toda la **Información importante de seguridad adicional.**

Consulte la **Ficha técnica adjunta.**

Novo Nordisk Inc., 800 Scudders Mill Road,  
Plainsboro, New Jersey 08536 EE. UU.

MixPro® y NovoSeven® son marcas comerciales registradas de  
Novo Nordisk Health Care AG.

Novo Nordisk es una marca comercial registrada de Novo  
Nordisk A/S.

© 2019 Novo Nordisk Impreso en EE. UU.  
US19NSVN00011 Febrero de 2019



**NovoSeven® RT**  
Coagulation Factor VIIa  
(Recombinant)

